

Tabulka trvalých následků úrazu

V případě události pojištěné políštěm Trvalé následky úrazu použijeme hodnotu Procenta (v %) uvedenou v posledním sloupci tabulky.

U jednoznačných následků je uvedena jedna hodnota Procenta, například u ztráty části končetiny. Některé následky ale mohou být různě závažné a v takovém případě je uvedeno procentní rozpětí, příkladem je omezení funkčnosti kloubu. V takovém případě určíme příslušné Procento trvalého poškození tak, aby v rámci uvedeného rozpětí odpovídalo povaze a rozsahu trvalého následku způsobeného úrazem.

U položek, kde je to možné, uvádíme na našich webových stránkách metodiku určení Procenta v závislosti na závažnosti následku. Příkladem je částečná ztráta zraku jednoho nebo obou očí, kdy výsledné Procento závisí na konkrétních hodnotách naměřeného snížení zrakové ostrosti jednotlivých očí.

Konečné Procento obvykle stanovíme na základě posudku smluvního lékaře z příslušného oboru medicíny, jehož podkladem je lékařské vyšetření nebo prohlídka pojištěné osoby. Trvalé následky, které svým charakterem nevyžadují postup dle předchozí věty (např. ztrátová poranění), ohodnotíme na základě Vámi doložených lékařských zpráv od odborného lékaře.

Položky pro případ kloubní náhrady zahrnují v hodnocení i případné omezení hybnosti. V ocenění za úplnou ztuhlost, omezení funkčnosti a porušení nervů jsou již zahrnuty oběhové a trofické poruchy (například svalová atrofie při omezené hybnosti končetiny apod.).

Stupně omezení rozsahu pohybu kloubů stanovujeme v porovnání s běžným rozsahem pohybu následovně:

- **lehký stupeň:** omezení pohyblivosti kloubu o 10-33 % ve všech rovinách pohybu,
- **střední stupeň:** omezení pohyblivosti kloubu o 34-66 % ve všech rovinách pohybu,
- **těžký stupeň:** omezení pohyblivosti kloubu o více než 66 % ve všech rovinách pohybu.

| Hlava a krk | Procento |
|---|----------|
| Lebka, mozkové poruchy, obličej | |
| 1 úplný defekt u klenbě lebni | 1-25 |
| 2 mírná demence | 20 |
| 3 středně těžká demence | 50 |
| 4 těžká demence | 80 |
| 5 paralýza trojklaného nervu v obličejové části | 5 |
| 6 jednostranná paralýza lícního nervu | 10 |
| 7 oboustranná paralýza lícního nervu | 15 |

| Zrak | Procento |
|--|----------|
| Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 35 % (resp. 40 % při ztrátě oka), na druhém oku více než 65 %. Hodnocení na obou očích nemůže činit více než 100 %. | |
| 1 úplná ztráta zraku obou očí | 100 |
| 2 ztráta zraku na obě oči - pouze světlocit | 95 |
| 3 částečná ztráta zraku obou očí (neostré vidění lepší než světlocit) | 2-95 |
| 4 ztráta zraku jednoho oka, pokud před úrazem druhé oko bylo bez vidění | 65 |
| 5 ztráta jednoho oka | 40 |
| 6 úplná ztráta zraku jednoho oka | 35 |
| 7 ztráta zraku jednoho oka - pouze světlocit | 30 |
| 8 částečná ztráta zraku jednoho oka (neostré vidění lepší než světlocit) | 2-25 |
| 9 ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně | 15 |
| 10 ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně | 18 |
| 11 ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky | 25 |

| | |
|--|--------|
| 12 koncentrické zúžení zorného pole jednoho oka | 0-25 |
| 13 koncentrické zúžení zorného pole obou očí | 10-100 |
| 14 hemianopsie - nekonzentrické zúžení zorného pole | 4-70 |
| 15 porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku | 5 |
| 16 lagoftalmus postraumatický operativně nekorigovatelný jednostranný | 8 |
| 17 lagoftalmus postraumatický operativně nekorigovatelný oboustranný | 16 |
| 18 ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná | 25 |
| 19 ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná | 50 |

| Sluch | Procento |
|---|----------|
| 1 oboustranná hluchota jako následek jediného úrazu | 60 |
| 2 úplná ztráta sluchu jednoho ucha | 15 |
| 3 úplná ztráta sluchu druhého ucha | 25 |
| 4 ztráta části sluchu obou uší | 0-40 |
| 5 ztráta části sluchu jednoho ucha | 0-15 |
| 6 ztráta vnějšího ucha | 10 |
| 7 trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce | 5 |
| 8 chronický hnisavý zánět středního ucha prokázán jako následek úrazu | 15 |
| 9 Poúrazový tinnitus jednostranný nebo oboustranný bez současné nedoslýchavosti | 0 |

| Nos, ústa, krk | Procento |
|---|----------|
| 1 ztráta celého nosu | 25 |
| 2 perforace nosní přepážky | 5 |
| 3 úplná ztráta čichu nebo chuti | 5 |
| 4 částečná ztráta čichu nebo chuti | 0 |
| 5 ztráta jednoho zubu trvalého chrupu (nebo jeho částí, pokud vede ke ztrátě vitality) | 1 |
| 6 ztráta každého dalšího zubu trvalého chrupu (nebo jeho částí, pokud vede ke ztrátě vitality) (max 20 % za všechny zuby) | 2 |
| 7 ztráta části zubu, která nevede ke ztrátě jeho vitality, nebo ztráta či poškození dočasných (mléčných) zubů nebo zubních náhrad | 0 |
| 8 ztráta jazyka | 30 |
| 9 trvalá tracheostomie | 50 |
| 10 zúžení hrtanu nebo průdušnice (včetně ztráty hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek a tracheostomie) | 0-65 |
| 11 ztráta části hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek | 10-25 |
| 12 deformace nosu bez funkční poruchy | 0 |

| Trup | Procento |
|---|----------|
| Hrudník, plíce, srdce, jícen | |
| 1 omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené | 1-30 |
| 2 poúrazové selhání obou plic - úplné | 100 |
| 3 ztráta jedné plíce | 50 |
| 4 jiné následky poranění obou plic podle stupně porušení funkce a rozsahu | 25-100 |
| 5 jiné následky poranění jedné plíce podle stupně porušení funkce a rozsahu | 15-40 |
| 6 srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním | 10-100 |
| 7 zúžení jícnu | 1-60 |
| 8 píštěl jícnu | 30 |
| 9 ztráta jednoho celého prsu | 15 |

| Břícho a trávicí ústrojí | Procento |
|---|----------|
| 1 ztráta sleziny | 25 |
| 2 ztráta části sleziny nebo jater | 1-15 |
| 3 porušení funkce břišní stěny s poruchou břišního lisu | 10-25 |
| 4 kýla | 0 |
| 5 porušení funkce trávicích orgánů | 10-100 |
| 6 nedomykavost řítních svěračů úplná | 60 |

| | |
|--|------|
| 7 nedomykavost řítních svěračů 2. stupně | 15 |
| 8 poúrazové zúžení konečníku nebo řiti | 1-60 |

| Močové a pohlavní orgány | Procento |
|---|----------|
| 1 ztráta obou ledvin | 100 |
| 2 ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny | 70 |
| 3 ztráta jedné ledviny | 25 |
| 4 píštěl močového měchýře nebo močové trubice | 50 |
| 5 jiné trvalé následky po poranění ledvin a močových cest | 1-50 |
| 6 hydrokela | 5 |
| 7 atrofie varlete způsobená úrazem | 2 |
| 8 ztráta jednoho varlete | 10 |
| 9 ztráta obou varlat či pyje do 50 let | 40 |
| 10 ztráta obou varlat či pyje od 51 let | 20 |
| 11 deformace pochvy a zevních ženských pohlavních orgánů | 10-50 |

| Páteř, mícha, pánev | Procento |
|---|----------|
| Při hodnocení trvalých následků se posuzuje páteř jako celek. Je nutné přiměřeně snížit plnění za předchozí chorobné degenerativní změny na páteři nebo za poškození předchozími úrazy. | |
| 1 poškození páteře s omezením hybnosti | 1-55 |
| 2 poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky | 10-100 |
| 3 porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin | 15-55 |

| Horní končetina | Procento |
|---|----------|
| Rameno, paže | |
| 1 ztráta horní končetiny v rameni nebo nad loketním kloubem | 70 |
| 2 úplná ztuhlost ramenního kloubu | 30 |
| 3 omezení pohyblivosti (vzpažení předpažením) ramenního kloubu lehkého stupně | 0-5 |
| 4 omezení pohyblivosti (vzpažení předpažením) ramenního kloubu středního stupně | 6-10 |
| 5 omezení pohyblivosti (vzpažení předpažením) ramenního kloubu těžkého stupně | 11-18 |
| 6 omezení pohyblivosti (pouze rotace) ramenního kloubu | 0-3 |
| 7 náhrada ramenního kloubu | 15 |
| 8 paklob pažní kosti | 40 |
| 9 viklavost ramenního kloubu | 0-20 |
| 10 nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární | 6 |
| 11 nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární | 3 |

| Loket, předloktí | Procento |
|---|----------|
| 1 ztráta horní končetiny mezi loketním kloubem a zápěstím | 60 |
| 2 úplná ztuhlost loketního kloubu | 25 |
| 3 úplná ztuhlost radioulnárních kloubů | 20 |
| 4 omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně | 0-6 |
| 5 omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně | 7-12 |
| 6 omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně | 13-20 |
| 7 náhrada loketního kloubu | 15 |
| 8 paklob loketní kosti | 20 |
| 9 paklob vřetenní kosti | 30 |
| 10 paklob kostí předloktí | 40 |
| 11 viklavost loketního kloubu | 0-25 |

| Zápěstí | Procento |
|---|----------|
| 1 ztráta ruky v zápěstí | 50 |
| 2 úplná ztuhlost zápěstí | 20 |
| 3 omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně | 0-5 |
| 4 omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně | 6-10 |
| 5 omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně | 11-17 |
| 6 viklavost zápěstí | 0-17 |
| 7 paklob člunkové kosti | 15 |
| 8 náhrada zápěstí | 15 |

| Prsty ruky | | |
|------------|--|-----|
| 1 | ztráta všech prstů ruky kromě palce | 40 |
| 2 | ztráta palce | 18 |
| 3 | ztráta celého koncového článku palce | 9 |
| 4 | úplná ztuhlost kloubu palce | 6 |
| 5 | porucha úchopové funkce palce při omezení funkčnosti kloubu place | 0-6 |
| 6 | ztráta prstu (kromě palce) | 8 |
| 7 | ztráta dvou článků prstu (kromě palce) | 6 |
| 8 | ztráta koncového článku prstu (kromě palce) | 3 |
| 9 | porucha úchopové funkce prstu (kromě place) | 0-6 |
| 10 | úplná ztuhlost kloubu prstu (kromě palce) při neporušené úchopové funkci | 1 |

| Poúrazové poruchy nervů motorické kvality | | |
|---|---|------|
| V případě poruchy pouze citlivosti (=senzitivní kvality) se pojistné plnění poskytuje ve výši 1/10 maxima uvedeného u konkrétní položky. Trvalé následky musí být potvrzeny EMG vyšetřením nebo svalovým testem. V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. V případě, že úrazem došlo k izolovanému poranění nervu, nelze současně hodnotit s omezenou hybností. | | |
| 1 | porucha podpažního nervu | 0-30 |
| 2 | porucha kmene nervu vřetenního | 0-35 |
| 3 | porucha nervu muskulokutánního | 0-30 |
| 4 | porucha kmene nervu loketního | 0-30 |
| 5 | porucha kmene nervu středního | 0-35 |
| 6 | porucha všech tří nervů (popř. i celého pletence pažního) | 0-55 |

| Dolní končetina | | Procento |
|-----------------|---|----------|
| Kyčle, stehno | | |
| 1 | ztráta dolní končetiny v kyčelním kloubu (nebo ve stehnu s pahýlem nevhodným k protézování) | 70 |
| 2 | ztráta dolní končetiny mezi kyčelním a kolenním kloubem | 60 |
| 3 | ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu | 60 |
| 4 | úplná ztuhlost kyčelního kloubu | 35 |
| 5 | omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně | 0-10 |
| 6 | omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně | 11-20 |
| 7 | omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně | 21-30 |
| 8 | náhrada kyčelního kloubu | 15 |
| 9 | pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekroza hlavice | 40 |
| 10 | deformace stehenní kosti s vychýlením od fyziologické normy od 5° až 45° | 5-45 |
| 11 | deformace stehenní kosti s vychýlením od fyziologické normy nad 45° | 50 |
| 12 | zkrácení dolní končetiny od 1 cm (nelze současně hodnotit s deformací končetiny) | 1-25 |
| 13 | zkrácení dolní končetiny do 1 cm | 0 |

| Koleno, hleň | | |
|--|---|-------|
| Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost, vynětí menisků a omezení hybnosti) nesmí přesáhnout 20 %. | | |
| 1 | ztráta dolní končetiny mezi kolenním a hlezenním kloubem | 50 |
| 2 | úplná ztuhlost kolenního kloubu | 30 |
| 3 | omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně | 0-7 |
| 4 | omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně | 8-12 |
| 5 | omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně | 13-25 |
| 6 | úplná náhrada kolenního kloubu | 15 |
| 7 | pakloub holenní kosti nebo obou kostí bérce | 40 |
| 8 | pakloub lýtkové kosti | 5 |
| 9 | deformace kostí bérce s vychýlením od fyziologické normy od 5° do 45° | 5-45 |
| 10 | deformace kostí bérce s vychýlením od fyziologické normy větším než 45° | 50 |
| 11 | viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce předního nebo zadního zkříženého vazy | 0-20 |
| 12 | viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce postranního vazy | 5 |
| 13 | porušení funkce kolenního kloubu po operativním odstranění jednoho menisku | 3 |

U následujících položek nejsme povinni plnit v případech, kdy příznaky poškození menisku nejsou prokázány magnetickou rezonancí (MRI) nebo artroskopií (ASK).

| | | |
|--------|---|-------|
| 12 | jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění jednoho menisku | 2 |
| 13 | jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění obou menisků | 3 |
| Kotník | | |
| 1 | ztráta nohy v hlezenním nebo v Chopartově kloubu | 30 |
| 2 | ztráta nohy v Lisfrancově kloubu nebo pod ním | 25 |
| 3 | omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně | 0-5 |
| 4 | omezení pohyblivosti hlezenního kloubu středního stupně | 6-10 |
| 5 | omezení pohyblivosti hlezenního kloubu těžkého stupně | 11-20 |
| 6 | úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení | 20-30 |
| 7 | omezení pronace a supinace nohy | 0-12 |
| 8 | úplná ztráta pronace a supinace nohy | 15 |
| 9 | náhrada hlezenního kloubu | 15 |
| 10 | viklavost hlezenního kloubu | 0-20 |

| Prsty nohy | | |
|------------|---|-----|
| 1 | ztráta všech prstů nohy | 15 |
| 2 | ztráta palce nohy se záprstní kostí | 15 |
| 3 | ztráta celého palce nohy | 10 |
| 4 | ztráta koncového článku palce nohy | 3 |
| 5 | omezení pohyblivosti základního kloubu palce | 0-7 |
| 6 | omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu palce | 0-3 |
| 7 | úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce nohy | 3 |
| 8 | úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy | 7 |
| 9 | ztráta malíku nohy se záprstní kostí | 10 |
| 10 | ztráta celého prstu nohy (kromě palce) | 2 |
| 11 | ztráta dvou článků prstu (kromě palce) | 1 |
| 12 | ztráta koncového článku prstu (kromě palce) | 0,5 |
| 13 | úplná ztuhlost kloubu prstu nohy (kromě palce) | 0 |

| Oběhové, trofické a nervové poruchy | | |
|---|---|------|
| 1 | poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině | 0-15 |
| V případě poruchy pouze citlivosti (=senzitivní kvality) se pojistné plnění poskytuje ve výši 1/10 maxima uvedeného u konkrétní položky. Trvalé následky musí být potvrzeny EMG vyšetřením nebo svalovým testem. V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. V případě, že úrazem došlo k izolovanému poranění nervu, nelze současně hodnotit s omezenou hybností. | | |
| 2 | poškození sedacího nervu | 0-50 |
| 3 | poškození stehenního nervu | 0-30 |
| 4 | poškození obturatorního nervu | 0-20 |
| 5 | poškození kmene nervu holenního | 0-35 |
| 6 | poškození kmene nervu lýtkového | 0-30 |

| | | |
|---|---|------|
| 7 | poškození hluboké větve nervu lýtkového | 0-20 |
| 8 | poškození povrchové větve nervu lýtkového | 0-10 |

| Ostatní trvalé následky | | Procento |
|--|---|----------|
| Jizvy | | |
| Plošné jizvy po popáleninách, poleptáních a jiných plošných poraněních | | |
| 1 | • do 0,25 % povrchu těla (u dospělého odpovídá povrchu obdélníku 5x9 cm) | 0 |
| 2 | • od 0,25 % do 15 % povrchu těla | 1-10 |
| 3 | • nad 15 % povrchu těla | 11-40 |
| Podélné jizvy | | |
| 4 | • v obličeji nebo na krku do 2 cm, mimo obličeje a krk do 10 cm | 0 |
| 5 | • v obličeji nebo na krku nad 2 cm, mimo obličeje a krk nad 10 cm (za 1 cm 0,1 %) | 0-3 |
| Keloidní jizvy (velké, nevzhledné, plasticky vystouplé jizvy přesahující okraj rány, ztvrdlé, zbarvené do červená až fialová) se v závislosti na jejich rozsahu hodnotí dvojnásobně. Maximální hodnota Procenta je 50. | | |
| Duševní poruchy, bolesti | | |
| 1 | Duševní poruchy způsobené úrazem | 0 |
| 2 | Poúrazové bolesti bez funkčního poškození | 0 |

Tabulka zlomenin a popálenin

V případě události pojištěné polštářem Zlomeniny a popáleniny použijeme hodnotu Procenta (v %) uvedenou v posledním sloupci.

U zlomenin a některých dalších položek uvádíme dvě hodnoty Procenta. První hodnota platí pro konzervativní (K) léčbu, druhá pro operativní (O). Operací v případě zlomenin rozumíme stabilizaci zlomeniny spojením kostních fragmentů kovovými implantáty (dlahy, šrouby, dráty, hřeby, zevní fixátory). Operací v případě poškození měkkých struktur kloubu končetiny rozumíme sešití svalů, šlach a vazů nebo jejich plastiku resp. sešití, částečné nebo plné odstranění menisků.

Pro úplné zlomeniny, infrakce, fisury, odlomení hran kostí nebo malých úlomků a subperiostální zlomeniny léčené konzervativně použijeme polovinu Procenta pro úplnou zlomeninu, u operativní léčby stejné Procento.

Poranění musí být jednoznačně prokázáno odpovídající zobrazovací metodou. Např. natržení/přetržení svalu nebo šlachy pomocí SONO, MRI, ASK; zlomenina kosti nebo chrupavky pomocí RTG atd. Za neprokázaná tělesná poškození pojistné plnění nevyplátíme, často jsou ve zdravotní dokumentaci označena slovy „podezření“, „možné“, „suspektní“, „susp.“, „veri simile“, „v.s.“, „verosimile“, „probabile“, „possibile“, „prob.“.

| Hlava a krk | | Procento |
|----------------------------------|--|----------|
| Zlomeniny | | |
| Zlomeniny v oblasti hlavy | | |
| 1 | spodiny lební | 40 44 |
| 2 | klenby lební (i více kostí) | 16 29 |
| 3 | okraje očníce | 16 16 |
| 4 | kostí nosních, přepážky | 6 8 |
| 5 | kostí lícni - jařmové | 15 17 |
| 6 | horní čelisti, spodiny očníce | 17 25 |
| 7 | dolní čelisti | 13 23 |
| 8 | dásňového výběžku | 13 13 |
| 9 | Le Fort I. (oboustranně lícni + h.č.) | 25 25 |
| 10 | Le Fort II. (oboustranně v úrovni nosu a oč.) | 33 33 |
| 11 | Le Fort III. (odtržení obl. skeletu od spod.) | 72 72 |
| Jiné následky úrazu | | |
| Oko | | |
| 1 | rána rohovky nebo bělmy s proděravěním | 13 |
| 2 | • kompl. nitroočním zánětem (NZ) / cizím tělískem (CT) / výhřezem / vklíněním duhovky | 18 |
| 3 | rána pronikající do očníce | 7 |
| 4 | • kompl. NZ / CT | 16 |
| 5 | pohmoždění oka s krvácením do přední komory | 11 |
| 6 | • kompl. druhotným zv. nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření (NT)/ opakovaným krvácením / NZ | 19 |
| 7 | natržení nebo ochrnutí duhovky | 10 |
| 8 | • komplikovaný zánětem duhovky / poúr. šedým z. | 19 |
| 9 | • s krvácením do sklivce a sítnice | 25 |
| 10 | • kompl. NT | 29 |
| 11 | částečné vykloubení čočky | 9 |
| 12 | • kompl. NT | 19 |
| 13 | úplné vykloubení čočky | 22 |
| 14 | • kompl. NT | 29 |
| 15 | popálení nebo poleptání epitelu rohovky s povrchovou nekrozou | 7 |
| 16 | • s hlubokou nekrozou | 14 |
| 17 | popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu (hluboká vrstva s vyšší závažností) | 43 |
| 18 | odchlípení sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka | 40 |
| 19 | poranění oka vyžadující bezprostřední vynětí | 15 |
| 20 | poranění okoohybného aparátu s dvojitým viděním | 20 |

| | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| Ucho | | |
| 1 | proděravění bubínku bez zl. lebních kostí | 6 |
| 2 | • kompl. druhotnou infekcí | 11 |
| 3 | otřes labyrintu společně s komocí mozku | 13 |
| 4 | otřes labyrintu s instalací implantátu pro nedoslýchavost | 20 |
| Zuby (pouze stálé a vitální) | | |
| 1 | ztráta/nutná extrakce 1 až 2 zubů | 5 |
| 2 | ztráta/nutná extrakce 3 až 4 zubů | 10 |
| 3 | ztráta/nutná extrakce 5 až více zubů | 15 |
| 4 | ztráta 1 nebo více zubů nad 1/3 korunky | 3 |
| 5 | zlomení 1 nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou | 17 |
| Krk | | |
| 1 | poleptání dutiny ústní a celé oblasti hltanu | 10 |
| 2 | poranění hltanu (PH) s nutností sutury | 14 |
| 3 | PH s nutností přechodné stomie, drenáže, nebo přechodné enterální výživy | 20 |
| 4 | PH s nutností implantace trvalého, obdokuvaného stentu | 25 |
| 5 | opaření jícnu s hospitalizací | 5 |
| 6 | poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu s pobytom na JIP | 30 |
| 7 | perforující poranění hrtanu a/nebo průdušnice | 14 |
| 8 | • s nutností chirurgického řešení | 31 |
| 9 | zlomenina jazyky a/nebo chrupavky hrtanu | 31 |
| Mozek | | |
| 1 | otřes 2. stupně s hospitalizací | 10 |
| 2 | otřes 3. stupně s hospitalizací | 20 |
| 3 | pohmoždění s násil. afázií delší než 1 měsíc | 40 |
| 4 | pohmoždění s následnou pseudocystou řešenou do 2 let od úrazu operační cestou | 50 |
| 5 | akutní a subakutní subdurální hematom s nutností ošetření s kraniektomií | 60 |
| 6 | dilacerace mozkové tkáně translačním či akceleračním mechanismem | 100 |
| 7 | difuzní axonální poškození m. s decerebrační rigiditou a MRI nálezem ve strukturách kmene mozku | 100 |

| Trup | | Procento |
|-------------------------------------|---|----------|
| Zlomeniny | | |
| Zlomeniny v oblasti hrudníku | | |
| 1 | kostí hrudní | 10 19 |
| 2 | jednoho žebra | 8 10 |
| 3 | dvou až pěti | 13 15 |
| 4 | více než pěti | 19 21 |
| 5 | dvířková zl. 2 až 4 žeber | 21 21 |
| 6 | dvířková zl. 5 a více | 27 27 |
| 7 | dvířková zl. kostí hrudní | 27 27 |
| Zlomeniny páteře | | |
| 1 | trnového výběžku obratle - jednoho | 11 11 |
| 2 | trnového výběžku obratle - 2 a více | 16 16 |
| 3 | příčného výběžku obratle - jednoho | 13 13 |
| 4 | příčného výběžku obratle - 2 a více | 19 19 |
| 5 | kloubního výběžku obratle | 15 15 |
| 6 | oblouku a pedikulu oblouku obratle | 23 23 |
| 7 | zubu čepovce (2. krční obratel) | 50 50 |
| 8 | kompresivní zl. těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních | 36 48 |
| 9 | roztříštěné zl. těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních | 71 71 |
| 10 | úrazové poškození ploténky při současném zlomenině těla obratle | 47 47 |
| Zlomeniny v oblasti pánve | | |
| 1 | odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní | 13 13 |
| 2 | odtržení hrbolu kosti sedací | 13 13 |
| 3 | jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací | 17 27 |
| 4 | lopaty kosti kyčelní | 19 30 |
| 5 | kostí křížové | 18 18 |
| 6 | kostrče | 13 13 |

| | | |
|--|---|---------|
| 7 | zadního nebo předního okraje kyčelní jámy | 24 54 |
| 8 | zadního nebo předního pilíře acetabula | 27 27 |
| 9 | oboustr. zl. kostí stydkých nebo jednostr. s rozestupem spony stydké | 61 61 |
| 10 | pánve (stydka + kyčelní/křížová) jednostranná | 47 47 |
| 11 | pánve oboustranná | 58 58 |
| 12 | rozestup spony stydké | 25 50 |
| 13 | spodiny acetabula | 34 64 |
| Jiné následky úrazu | | |
| Oblast hrudníku | | |
| 1 | roztržení plíce/plíc | 26 |
| 2 | otřes, pohmoždění srdce bez operace | 0 |
| 3 | pohmoždění myokardu s operací chlopně | 50 |
| 4 | tupé poranění srdce se suturou perikardu | 75 |
| 5 | pronikající poranění srdce se suturou perikardu | 82 |
| 6 | pronikající poranění srdce, cílená sutura perikardu, ECMO a UPV | 90 |
| 7 | pronikající poranění srdce, cílená sutura perikardu s rekonstrukcí struktur srd. stěny či chlopní, ECMO a UPV | 100 |
| 8 | roztržení bránice | 31 |
| 9 | pneumotorax plášťový zavřený | 18 |
| 10 | pneumotorax s drenáží | 23 |
| 11 | pneumotorax otevřený nebo ventilový | 31 |
| 12 | mediastinální nebo podkožní emfyzém | 25 |
| 13 | krvácení do hrudníku - léčené konz. | 17 |
| 14 | krvácení do hrudníku - léčené oper. | 27 |
| Oblast břicha | | |
| Přetržení / rozdrčení se hodnotí stejně jako roztržení. | | |
| 1 | rána pronikající do dutiny břišní | 12 |
| 2 | roztržení jater nebo žlučníku | 28 |
| 3 | natržení / roztržení sleziny | 42 |
| 4 | roztržení slinivky břišní | 31 |
| 5 | proděravění žaludku | 25 |
| 6 | proděravění dvanáctníku | 25 |
| 7 | roztržení tenkého střeva - bez resekcce | 20 |
| 8 | roztržení tenkého střeva - s resekcí | 23 |
| 9 | roztržení tlustého střeva - bez resekcce | 21 |
| 10 | roztržení tlustého střeva - s resekcí | 24 |
| 11 | roztržení okruží - bez resekcce | 18 |
| 12 | roztržení okruží - s resekcí | 22 |
| 13 | roztržení ledviny - léčené konz. | 19 |
| 14 | roztržení ledviny - léčené oper. | 27 |
| 15 | roztržení ledviny - vedoucí k odnětí ledviny | 38 |
| 16 | roztržení močového měchýře | 21 |
| 17 | roztržení močové trubice léčené oper. | 23 |
| Vymknutí (luxace) páteře | | |
| Pokud nedojde k poškození míchy a jejích kořenů, je podmínkou hospitalizace a prokázány posun obratlů. | | |
| 1 | mezi lebku a 1. krčním obratlem | 50 |
| 2 | krční, hrudní, bederní páteře | 50 |
| 3 | křížokyčelní (v SI kloubu) | 50 |
| 4 | kostrče | 13 |
| Mícha | | |
| 1 | otřes s hospitalizací | 15 |
| 2 | pohmoždění s hospitalizací | 25 |
| 3 | pohmoždění s hospitalizací na JIP | 58 |
| 4 | transverzální léze kompletní s plegií, JIP | 100 |

| Horní končetina | Procento |
|---|----------|
| Zlomeniny | |
| Zlomenina lopatky nebo klíční kosti | K O |
| 1 lopatky | 14 19 |
| 2 klíční kosti | 10 20 |
| Zlomenina kosti pažní | K O |
| 1 odlomení malého hrbolu | 19 35 |
| 2 hlavice, odl. velkého hrbolu, krčku | 16 30 |
| 3 těla | 21 41 |
| 4 nad kondyly (supra-) | 18 32 |
| 5 nitrokloubní (trans- a inter-) | 20 33 |
| 6 vnitřního nebo zevního epikondyly | 13 31 |
| Zlomenina kosti loketní | K O |
| 1 okovce | 12 19 |
| 2 korunového výběžku | 15 19 |
| 3 těla | 20 31 |
| Zlomenina kosti vřetenní | K O |
| 1 hlavičky | 14 22 |
| 2 těla nebo krčku | 19 30 |
| 3 bodcovitého výběžku | 13 19 |
| 4 dolního konce | 18 27 |
| 5 epifyzeolýza (dospívající) | 10 22 |
| Zlomenina obou kostí předloktí | K O |
| 1 těla, dolních konců | 23 43 |
| 2 Monteggia nebo Galeazzi luxační zl. | 36 49 |
| Zlomenina ruky | K O |
| 1 kosti člunkové | 27 40 |
| 2 jiné kosti zápěstí | 16 19 |
| 3 několika kostí zápěstí | 24 27 |
| 4 luxační zl. první kosti záprstní (Bennettova) | 19 23 |
| 5 jedné kosti záprstní | 12 20 |
| 6 několika kostí záprstních | 14 23 |
| 7 jednoho článku jednoho prstu | 8 15 |
| 8 více článků jednoho prstu | 12 19 |
| 9 dvou a více prstů | 16 27 |
| Jiné následky úrazu | |
| Natržení (neúplné přerušeni) | K O |
| 1 šlach natahovačů/ohýbačů 1 nebo 2 prstů | 10 10 |
| 2 šlach natahovačů/ohýbačů 3 a více prstů | 13 13 |
| 3 šlachy ruky v zápěstí | 19 19 |
| 4 šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního | 12 23 |
| 5 svalu nadhřebenového, rotátorové manžety | 13 13 |
| 6 jiného svalu, šlachy, vazy | 8 8 |
| Přetržení nebo odtržení (úplné přerušeni) | K O |
| 1 šlach natahovačů/ohýbačů 1 nebo 2 prstů | 19 19 |
| 2 šlach natahovačů/ohýbačů 3 a více prstů | 22 22 |
| 3 šlachy ruky v zápěstí | 26 26 |
| 4 šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního | 12 23 |
| 5 svalu nadhřebenového, rotátorové manžety | 19 23 |
| 6 jiného svalu, šlachy, vazy | 15 15 |
| Vymknutí léčené napravením (repozicí) lékařem | K O |
| 1 mezi klíčkem a kostí hrudní (SC kloub) | 8 18 |
| 2 mezi klíčkem a lopatkou Tossy II,III (AC kloub) | 10 21 |
| 3 kosti pažní / ramene (GH, HS kloub) | 13 23 |
| 4 předloktí / lokte | 14 24 |
| 5 zápěstí | 19 30 |
| 6 záprstních kostí, kloubu nebo kloubů prstů | 13 13 |
| Amputace | |
| 1 paže v ramenním kloubu | 73 |
| 2 paže v oblasti pažní kosti | 63 |
| 3 předloktí | 44 |
| 4 ruky | 36 |
| 5 všech prstů nebo jejich částí s kostí | 34 |
| 6 2-4 prstů nebo jejich částí s kostí | 27 |
| 7 1 prstu nebo jeho částí s kostí | 15 |

| Dolní končetina | Procento |
|--|----------|
| Zlomeniny | |
| Zlomenina kosti stehenní | K O |
| 1 krčku nebo hlavice | 41 53 |
| 2 krčku - léčená endoprotézou | - 100 |
| 3 epifyzeolýza hlavice (dospívající) | 31 58 |
| 4 velkého chocholíku | 21 21 |
| 5 malého chocholíku | 16 16 |
| 6 pertrochanterická (skrz chocholíky) | 35 58 |
| 7 subtrochanterická (pod chocholíky) | 54 69 |
| 8 těla | 52 69 |
| 9 suprakondylická (nad kondyly) | 41 69 |
| 10 kloubní chrupavky na kondylech | 23 32 |
| 11 epifyzeolýza distálního konce (dospívající) | 31 58 |
| 12 odlomení kondyly | 22 31 |
| 13 nitrokloubní zl. dolního konce (trans-, inter-) | 37 71 |
| 14 odlomení obou kondylů | 42 84 |
| Zlomenina česky | K O |
| 1 těla | 21 32 |
| 2 kloubní chrupavky | 18 22 |
| Zlomenina kosti holenní (nad kotníkem) | K O |
| 1 kloubní chrupavky na kondylech | 21 21 |
| 2 zl. nebo odlomení mezihřbolové vyvýšeniny | 30 38 |
| 3 nitrokloubní zl. horního konce jednoho kondyly | 29 37 |
| 4 nitrokloubní zl. horního konce obou kondylů | 35 49 |
| 5 odlomení drsnatiny | 19 23 |
| 6 těla | 36 70 |
| 7 odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní | 20 25 |
| Zlomenina kosti lýtkové (nad kotníkem) | K O |
| 1 těla | 16 17 |
| Zlomenina v oblasti kotníku | K O |
| 1 zevního | 15 24 |
| 2 vnitřního | 18 27 |
| 3 zevního s odlomením zadní hrany k. holenní | 27 36 |
| 4 obou kotníků | 25 36 |
| 5 obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní | 27 42 |
| Zlomeniny nohy (zánártí, nártu, prstů) | K O |
| 1 hrbolu nebo výběžku kosti patní | 18 18 |
| 2 těla kosti patní | 31 48 |
| 3 hlezenní kosti | 31 48 |
| 4 zadního výběžku hlezenní kosti | 10 10 |
| 5 kosti krychlové | 19 23 |
| 6 kosti člunkové | 21 43 |
| 7 kosti klínové | 19 23 |
| 8 několika kostí klínových | 23 31 |
| 9 nártních kústek palce nebo malíku | 13 21 |
| 10 nártních kústek ostatních prstů | 11 19 |
| 11 nártních kústek několika prstů | 16 22 |
| 12 článku palce | 10 16 |
| 13 článku jiného prstu | 7 12 |
| 14 více článků jednoho nebo více prstů | 12 17 |
| Jiné následky úrazu | |
| Natržení (neúplné přerušeni) | K O |
| 1 Achillovy šlachy | 8 11 |
| 2 vnitřního nebo zevního postranního vazy kolenního | 12 13 |
| 3 zkříženého vazy kolenního | 15 15 |
| 4 vnitřního nebo zevního postranního vazy hlezna | 6 12 |
| 5 většího svalu, šlachy nebo patelárního vazy | 8 10 |
| Přetržení nebo odtržení (úplné přerušeni) | K O |
| 1 přetržení Achillovy šlachy | 19 24 |
| 2 přetětí Achillovy šlachy | 19 29 |
| 3 vnitřního nebo zevního postranního vazy kolenního | 17 25 |
| 4 zkříženého vazy kolenního | 19 31 |
| 5 vnitřního nebo zevního postranního vazy hlezna | 15 15 |

| | |
|--|---------|
| 6 většího svalu, šlachy nebo patelárního vazy | 15 20 |
| Poranění menisků - úrazové | K O |
| 1 zevního nebo vnitřního menisku | 12 17 |
| Vymknutí léčené napravením (repozicí) lékařem | K O |
| 1 kloubu kyčelního | 21 27 |
| 2 kloubu kolenního | 25 30 |
| 3 česky | 13 19 |
| 4 kloubu hlezenního (vč. kotníků) | 21 26 |
| 5 nártních kostí (jedné i více) | 15 20 |
| 6 základního kloubu jednoho prstu (kromě palce) | 7 7 |
| 7 základního kloubu více prstů nebo palce | 10 10 |
| 8 mezičlánkového kloubu jednoho prstu (kromě palce) | 6 6 |
| 9 mezičlánkového kloubu více prstů nebo palce | 8 8 |
| Amputace | |
| 1 stehna, exartikulace kyčelního kloubu | 100 |
| 2 obou bérců | 100 |
| 3 bérce | 84 |
| 4 obou nohou | 69 |
| 5 nohy | 65 |
| 6 palce nohy nebo jeho části s kostí, několika prstů | 17 |
| 7 jednoho prstu (jiného než palec) | 10 |

| Popáleniny, poleptání nebo omrzliny | Procento |
|---|----------|
| Prvního stupně | |
| 1 libovolný rozsah | 0 |
| Druhého stupně chirurgicky ošetřené | |
| 1 do 20 cm ² povrchu těla | 4 |
| 2 nad 20 cm ² do 1% povrchu těla | 10 |
| 3 nad 1 % do 5 % povrchu těla | 12 |
| 4 nad 5 % do 15 % povrchu těla | 13 |
| 5 nad 15 % do 20 % povrchu těla | 15 |
| 6 nad 20 % do 30 % povrchu těla | 23 |
| 7 nad 30 % do 40 % povrchu těla | 36 |
| 8 nad 40 % do 50 % povrchu těla | 55 |
| 9 větším než 50 % povrchu těla | 100 |
| Třetího stupně chirurgicky ošetřené | |
| 1 do 6 cm ² povrchu těla | 6 |
| 2 nad 6 cm ² do 1% povrchu těla | 15 |
| 3 nad 1 % do 5 % povrchu těla | 21 |
| 4 nad 5 % do 10 % povrchu těla | 27 |
| 5 nad 10 % do 15 % povrchu těla | 36 |
| 6 nad 15 % do 20 % povrchu těla | 48 |
| 7 nad 20 % do 30 % povrchu těla | 58 |
| 8 nad 30 % do 40 % povrchu těla | 82 |
| 9 větším než 40 % povrchu těla | 100 |